

تقييم أداء الممرضات تجاه الأطفال المصابين بالتشنجات بأقسام الأطفال المختلفة بمستشفى الأطفال الجامعي بجامعة الزقازيق

لبنى طة رشاد احمد^(١)، أمل محمد محمد الداخني^(٢)، عبد الرازق محمد حفنى الشيخ^(٣)، سماح العوضى
بسام^(٤)

^(١) بكالوريوس تمريض ، ^(٢) أستاذ تمريض الأطفال - كلية التمريض - جامعة الزقازيق، ^(٣) أستاذ طب الأطفال
- كلية الطب - جامعة الزقازيق، ^(٤) أستاذ مساعد تمريض الأطفال
كلية التمريض - جامعة الزقازيق

مقدمة:

التشنجات هي الاضطرابات العصبية الأكثر شيوعا لدى الأطفال و السبب الرئيسي لدخول الأطفال قسم الطوارئ والمستشفيات ، فهي تسبب عاقبة جسدية ونفسية كبيرة لدى الأطفال وغالبا ما تكون عواقب طويلة الأجل. وعلاوة على ذلك، تعتبر التشنجات هي مشكلة صحية خطيرة تسبب الوفاة في الأطفال

الأداة الأولى: استمارة استبيان لتقييم معلومات الممرضات.

الأداة الثانية: استمارة تقييم للأطفال المصابين بالتشنجات .

الأداة الثالثة: قائمة ملاحظة لتقييم أداء الممرضات.

النتائج:

• متوسط أعمار الأطفال عينة الدراسة ٢.٣ ± ٠.٧١ سنة

• يمثل الذكور ٦٢.٩ ٪ من الأطفال فى عينة الدراسة بينما ٣٧.١ ٪ كان من الاناث

• ٣٥.٥ ٪ من الأطفال المصابين بتشنجات كان بسبب التشنجات الحرارية بينما ٢٢.٦ ٪ منهم كان نتيجة التهاب بالمخ

• تبين أن ٥٤.٨ ٪ من الاطفال تم اجراء فحوصات لهم عن طريق الدم ، تليها ٤٨.٤ ٪

تم عمل الاشعة المقطعية لهم

• وجد أن متوسط أعمار الممرضات عينة الدراسة كان ٢٩.٦١ ± ٦.٥٩ سنة

• بالنسبة لمؤهل الممرضات وجد أن ٩٠.٣ ٪ من الممرضات عينة البحث قد حصلن على دبلوم تمريض بينما ٩.٧ ٪ حاصلات على معهد فنى تمريض.

• فيما يتعلق بسنوات الخبرة للممرضات عينة البحث تبين أن ٥٨ ٪ منهم لديهم عشرة سنوات خبرة وأكثر

الهدف من هذه الدراسة

تقييم الرعاية التمريضية المقدمة للأطفال المصابين بالتشنجات في الاقسام المختلفة بمستشفى الأطفال الجامعي بالزقازيق •
التصميم البحثى :

تم استخدام تصميم وصفي

مكان الدراسة:

مستشفى الأطفال الجامعي بالزقازيق •
عينة الدراسة :

تتكون العينة من جميع الممرضات اللاتي يقدمن الرعاية التمريضية المباشرة للأطفال المصابين بتشنجات الولادة وكان عددهن اثنان وستون ممرضة .وكذلك اثنان وستون طفل مصاب بالتشنجات وقد استغرقت عملية جمع البيانات والمعلومات ٦ أشهر ابتداء من يناير الى يونيه ٢٠١٣. **أدوات جمع البيانات:**

أدوات جمع البيانات :

اشتملت أدوات البحث ثلاث أدوات وتم تصميمهما بواسطة الباحثة تحت اشراف المشرفين.

الصحية المقدمة لهؤلاء الأطفال في المستشفى كانت سيئة

التوصيات:

توصى الدراسة ان تكون نسبة التمريض للاطفال ٢-١ لضمان توفير رعاية تمريضية جيدة وكذلك عمل برامج تدريبية للممرضات تخص كل جوانب الرعاية الخاصة بالأطفال المصابين بالتشنجات.

• أظهرت النتائج أن ٩٥.٢٪ من الممرضات لم يحصلن على أى برنامج تدريبي عن التشنجات .

• اوضحت الدراسة ان ٥٦.٥٪ من الممرضات قد حصلن على مستوى جيد للغاية عن معلوماتهن عن التشنجات يليهم ٢٤.٢٪ لديهم معلومات جيدة بينما ٤١.٩٪ كانت معلوماتهن غير جيدة

• وجد أن هناك علاقة ذو دلالة احصائية بين معلومات الممرضات تجاه الاطفال المصابين بالتشنجات وبين أدائهم

الخلاصة:

وبناء على نتائج هذه الدراسة يمكن أن نخلص إلى أن مستوى معلومات الممرضات تجاه الاطفال المصابين بالتشنجات كانت جيدة للغاية للأطفال بينما الرعاية