

إرشادات الممارسة السريرية لمنع عدوى قسرة الوريد المركزي

سميرة سعدون سعداوي (1)، إيمان محمد عبدالعزيز (2)، ماجدة عبدالعزيز محمد (3)
 (1) بكالوريوس تمريض-كلية التمريض-جامعة الزقازيق، (2) مدرس التمريض الباطني الجراحي-كلية
 التمريض-جامعة الزقازيق، (3) أستاذ التمريض الباطني الجراحي-كلية التمريض-جامعة عين شمس

مقدمة:

أصبح تحسين سلامة المريض وتقليل الإصابة بعدوي قسرة الوريد المركزي في وحدة العناية المركزة من أولويات المستشفيات، حيث تلعب الممرضة دورا هاما لمنع العدوى .

الهدف من الدراسة:

هدفت الدراسة إلي دراسة تأثير الارشادات السريرية للوقاية من عدوى قسرة الوريد المركزي على معلومات و أداء الممرضات.

طرق و أدوات البحث:

مكان و عينة الدراسة:

تم إجراء الدراسة في وحدة العناية المركزة بمستشفى الجراحة الجديد التابع لمستشفيات جامعة الزقازيق، وتحتوي الوحدة على ٢٥ سرير. وقد شملت عينة الدراسة 40 من الممرضات اللاتي تعملن في المستشفى المذكورة أعلاه، ممن انطبقت عليهم معايير الانضمام للدراسة و هي اعطاء الرعاية المباشرة للمرضى ، لديهن سنة على الأقل من الخبرة في وحدة العناية المركزة وتقبلن المشاركة في الدراسة.

أدوات جمع البيانات:

اشتملت أدوات جمع البيانات لهذه الدراسة على : استمارة استبيان و استمارة ملاحظة أداء الممرضات.

النتائج:

وكشفت نتائج الدراسة عن أنه قبل تطبيق الارشادات كانت غالبية الممرضات لديهن مستوى غير مرضى في المعلومات و الأداء ولكن تم رصد تحسن في الأداء بعد تطبيق الارشادات، كما أشارت النتائج أيضا إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين المعلومات و أداء الممرضات قبل و بعد تطبيق الارشادات.

الخلاصة:

تحسن في معلومات و أداء الممرضات بعد تطبيق إرشادات منع عدوى قسرة الوريد المركزي.

التوصيات:

في ضوء النتائج الرئيسية للدراسة الحالية تم اقتراح التوصيات التالية:
 توفير ورش عمل وندوات لمنع عدوى قسرة الوريد المركزي بشكل مستمر، بالإضافة إلى إتاحة كتيبات لارشادات منع عدوى قسرة الوريد المركزي بوحدة العناية المركزة و تحديثها بشكل دوري. وهناك حاجة إلى مزيد من البحوث لدراسة مدى تأثير إرشادات منع عدوى قسرة الوريد المركزي على نتائج المرضى.