

معرفة واتجاه وأداء الممرضات نحو الاستخدام الآمن للقيود الجسمانية في وحدة العناية المركزة

ام محمد عبد اللطيف عبد الستار

مدرس بقسم التمريض الباطنى الجراحى- كلية التمريض- جامعة المنوفية

استخدام القيود الجسمانية . لا توجد علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين معرفة الممرضات ودرجة الأداء . بينما كان هناك علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين معرفة الممرضات واتجاهاتهن . كما وجدت علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين اتجاه الممرضات وادائهن .

الخلاصة :

خلصت الدراسة الحالية إلى أن هناك عدم كفاية في معرفة وأداء الممرضات وهناك اتجاه سلبي نحو استخدام القيود الجسمانية في وحدة العناية المركزة .

التوصيات :

أوصت الدراسة أنه ينبغي تنظيم برامج تدريبية للممرضات لتحسين معارفهن بشأن تطبيق القيود الجسمانية، وينبغي استخدام برامج التوجيه للممرضات المعينة حديثا لتحسين أدائهن ومعرفتهن فيما يتعلق باستخدام القيود .

مقدمة

يتميز مرضى الحالات الحرجة بوجود مشا كل صحية فعلية أو محتملة تهدد حياتهم ، مما يتطلب المراقبة المستمرة . الحفاظ على المستوى الأمثل من الراحة للمريض و السلامة مع توفير المتابعة والعلاج لمرضى الحالات الحرجة ضرورى جدا . الهياج هو أكبر مشكلة لمرضى الحالات الحرجة في وحدة العناية المركزة وهو ليس تشخيص، بل عرض للعديد من الأمراض والاضطرابات . قد ينتج الهياج عن الألم، والآثار السلبية للأدوية أو اختلال السوائل والالكتروليات أو الضغوط البيئية أو النفسية والاجتماعية، أو المتلازمات النفسية . وتستخدم القيود الجسمانية لضمان سلامة المرضى الذين يعانون من الهياج من خلال منع تدخلهم في علاجهم، الحد من فرط النشاط الجسماني، وتسهيل الرعاية اللازمة، و تجنب إيذاء أنفسهم أو الآخرين .

الهدف من الدراسة:

أجريت هذه الدراسة لتحديد معرفة واتجاه وأداء الممرضات نحو الاستخدام الآمن للقيود الجسمانية في وحدة العناية المركزة .

مكان الدراسة :

أجريت الدراسة الحالية في وحدات العناية المركزة في مستشفى جامعة المنوفية و مستشفى شبين الكوم التعليمي .

العينة:

شملت العينة جميع الممرضات في وحدات العناية المركزة في مكان الدراسة السابق (95 ممرضة : 60 ممرضة من مستشفى جامعة المنوفية و 35 ممرضة من مستشفى شبين الكوم التعليمي) كما شملت العينة 95 مريض ممن يتم استخدام القيود الجسمانية لهم .

أدوات جمع البيانات:

تم استخدام أداة واحدة لجمع البيانات وهي استمارة استبيان .

النتائج :

حوالي ثلثي الممرضات كان لديهن معرفة قليلة وحوالي ثلثهن لديهن معرفة متوسطة، ومعظم الممرضات لديهن اتجاه سلبي وأداء متوسط نحو