

برنامج تثقيفي لمرضات الأمومة عن الإبرة الوريدية و تأثيرها على معدل الالتهاب الوريدي

جيهان سيد على⁽¹⁾ ، تهاني السيد عمرو⁽²⁾

(1) أستاذ مساعد تـمريض البالغين – كلية التمريض- جامعة المنيا،(2) مدرس تـمريض صحة الأم

وحديثي الولادة – كلية التمريض- جامعة المنوفية

أكثر من 10 سنوات واغلبهم حضرن دورات تدريبية.

- مستوى معلومات وممارسات الممرضات عن الحقن الوريدي وأهميته وطرق اختيار الوريد الصحيح واستخدام الطريقة الصحيحة لإدخال الإبرة الوريد ومضاعفاتها كانت منخفضة قبل البرنامج بينما زادت بعد تطبيق البرنامج التعليمي التطبيقي وانخفاض مضاعفات الالتهاب الوريدي.
- المضاعفات الناتجة عن الحقن الوريدي نتيجة ترك اختيار حجم الإبرة الوريدية تبعاً لسن المريض وحجم الوريد واختيار الوريد المرين السليم أو بسبب سوء الأداء أثناء تدخيل أو توصيل الإبرة الوريدية أو بسبب المحاليل وكميتها أو استخدام عدد أكثر من الإبرة أثناء التدخيل في الوريد الواحد.
- نسبة حدوث الالتهاب الوريدي لدى المرضى قد انخفضت بعد تطبيق البرنامج التثقيفي والتعليمي للممرضات.

الخلاصة:

استطاع البرنامج التثقيفي لمرضات الأمومة في رفع معلوماتهن و أيضاً أدائهن في تركيب الإبرة الوريدية. كما نجح البرنامج في تقليل حدوث الالتهاب الوريدي لدى المرضى.

التوصيات:

- برنامج تدريبي مستمر لزيادة معرفتهم وممارستهم حول الإبرة الوريدية لجميع الممرضين والممرضات.
- تطبيق الخطة المصممة من أجل منع حدوث المضاعفات على مدى واسع.
- تأهيل الممرضة علمياً وعملياً لتنفيذ المهارات الخاصة بالحقن الوريدي
- ضرورة معرفة الممرضة بمدى خطورة مضاعفات الحقن الوريدي وكيفية تجنب ذلك وذلك من خلال معرفتها بتطبيق الخطة المصممة واستمارة تقييم الالتهاب الوريدي..
- إعادة تطبيق هذه الدراسة على عينة أكبر.

مقدمة:

يعد استخدام الوصلات الوريدية الطرفي جزء هام جداً في رعاية المريض لأنه من خلالها يتم مد المريض بالمحاليل التعويضية والأدوية اللازمة لتحسين حالة المريض الصحية. وتتعدد الأماكن التي يسمح أن ندخل أو نصل بها الوصلة الوريدية وأيضاً حجم الوصلات باختلاف سن المريض لتجنب حدوث المضاعفات الناتجة عن الوصلات الوريدية مثل كدمة أو التهاب في الوريد يجب إتباع الخطة المصممة لمنع حدوث مضاعفات الوصلات الوريدية بواسطة الباحثين.

هدف البحث:

تقييم تأثير البرنامج التثقيفي لمرضات الأمومة عن الإبرة الوريدية وتأثيرها على معدل الالتهاب الوريدي

عينة ومكان البحث:

استخدمت عينة شملت 40 ممرضة و40 مريضة في قسم النساء والتوليد بمستشفى المنيا الجامعي

أدوات البحث:

تم جمع البيانات الخاصة بالدراسة عن طريق استخدام الأدوات التالية:

أولاً بالنسبة للممرضات :

- استمارة لتقييم معلومات الممرضات عن الإبرة الوريدية والمضاعفات.
- استمارة ملاحظة لتقييم أداء الممرضات لتركيب الإبرة الوريدية.

ثانياً بالنسبة للمرضى:

- استمارة استبيان الحالة الديموجرافية للمرضى.
- استمارة لتقييم مكان الإبرة الوريدية وحدث الالتهاب الوريدي وفي أي مرحلة : تم التقييم باستخدام مقياس التقييم ويقسم تدرجياً إلى خمس درجات وتبدأ من عدم حدوث مضاعفات إلى الدرجة خمسة وهو أعلى درجة لحدوث المضاعفات .

النتائج :

- وقد أسفرت الدراسة عن النتائج التالية:
- متوسط أعمار الممرضات محل البحث تتراوح بين 7,855±30,2 سنة.
- أغلبهم متزوجات واغلبهم من الحاصلات على دبلوم تـمريض. ومعظم سنوات الخبرة